

Informovaný souhlas pacienta s podáním infuze vitaminu C (Injektopas)

Jméno, příjmení
r.č.:
bytem.....
alergie.....

Informace o právech klienta Vážená klientko, vážený kliente, dovolte nám přivítat Vás na naš poliklinice a ujistit Vás, že si velmi vážíme Vaši důvěry. Chceme Vás touto formou informovat o plánovaném léčebném výkonu. Věnujte proto, prosím, náležitou pozornost následujícím informacím. Informace o průběhu infuzní léčby Vitamin C neboli kyselina askorbová má pro člověka zásadní význam, lidský organismus si ho nedokáže vytvořit a je odkázaný na jeho příjem v určitých potravinách. Vitamin C má zásadní a nenahraditelnou roli při potlačování oxidativního stresu. Navíc je nezbytný pro normální průběh důležitých biochemických reakcí, správný metabolismus tuků, podílí se na tvorbě kolagenu, blokuje tvorbu karcinogenů, podporuje imunitní pochody a funkci mozku, podporuje vstřebávání železa. Nitrožilně lze podat nárazově vysoké, gramové dávky (příznaky předávkování nebyly popsány). Dosažená vysoká koncentrace se do 6 hodin po infuzi vrací k počáteční hodnotě, proto je vhodné infuze opakovat. Jeho metabolity jsou vylučovány převážně močí. U onkologických pacientů, kteří podstupují chemoterapii, či ozařování doporučujeme konzultaci ošetřujícího onkologa. Opatrnost v indikaci a podávání je třeba u klientů s oxalátovými ledvinovými kameny, u astmatiků, při onemocněních z nadmerného ukládání železa v organismu. Vitamin C může ovlivnit účinek léků na ředění krve (Warfarin), může zvýšit účinnost léků proti shlukování krevních destiček (Anopyrin, Godasal), zvýšit plazmatické hladiny tabletové hormonální antikoncepcie a může vést k nepřesnému stanovení hladiny cukru v krvi. Tato infuze je prostředek podporující, doplňující a zesilující účinek při léčbě nádorových chorob, není lékem. Komplikace, které se mohou vyskytnout, jsou nečetné, až ojedinělé. Může se objevit reakce na kůži - např. reakce na dezinfekci nebo náplast, zánět povrchové žily - zarudlý bolestivý pruh na paži. Před a po infuzi Vám sestra změří krevní tlak. Pokud budete cítit v místě vpichu tlak, pálení, bolest, nebo jakýkoli druh nevolnosti, okamžitě informujte sestru. Po skončení a odstranění infuze sestrou, zůstaňte podle potřeby, minimálně však ještě 5 minut ležet, stlačujte místo vpichu a vstávejte dle pokynů sestry. V den aplikace je vhodné neopomenout příjem tekutin a vypít minimálně 1,5 - 2 litru za den. Prohlášení a souhlas klienta Já, níže podepsaný/á, prohlašuji, že jsem byl/a sestrou srozumitelně informován/a o povaze a průběhu infuzní terapie a byl/a jsem informován/a i o možných rizicích tohoto výkonu. Přečetl/a jsem si informace o možných rizicích a komplikacích infuzní terapie a infuzní terapii podstupují na vlastní zodpovědnost. Měl/a jsem možnost klást sestře doplňující otázky* a mé dotazy byly zodpovězeny. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením infuzní terapie. Všemu jsem porozuměl/a a s navrženým postupem souhlasím.

Poučení provedl: * Byly kladený tyto otázky:

V Brně Dne.....

Podpis klienta

Podpis pracovníka

Průběh infuze

Tlak krve před infuzí..... Tlak krve po infuzi.....

Místo vpichu..... Průběh infuze.....